

Laboratoire	SCOTCH TEST	Cod.Mod.IO238.12 del 09/05/2024 Rev. 01
-------------	--------------------	---

RECHERCHE D'OEUF D'ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXYURES) - SCOTCH TEST

Pour l'exécution du test ils sont nécessaires:

1. Ruban adhésif (Scotch) transparent (il doit être rigoureusement du type transparent pour permettre l'observation au microscope,
2. Un petit verre porte-objets pour microscope
3. Un abaisse-langue ou un objet avec la pointe plate.

Le petit verre est disponible au Centre Prélèvements de l'hôpital de 8h00 à 10h00 ou en Laboratoire Analyse de 8h00 à 15h00, du lundi au vendredi.

INSTRUCTIONS POUR LA RECOLTE DE L'ECHANTILLON:


- Le soir précédent le prélèvement, le patient ne doit pas se laver
- Le prélèvement doit être effectué au matin, avant que le patient se lave
- Couper avec les ciseaux un petit bout de scotch de la longueur du petit verre porte-objets
- Mettre le scotch sur le bout d'un abaisse-langue en ayant soin que la partie adhésive soit à l'extérieur



- Appliquer la partie adhésive contre la région de l'orifice anal, en pressant légèrement



- Emporter et faire adhérer le scotch sur le petit verre, bien détendu et sans plis



Remettre l'échantillon au **Centre Prélèvements Hospitaliers de 8h00 à 10h30**